



Conseils pour
l'allaitement, les soins,
le biberon, la maman,
le bébé...

SERVICE MATERNITÉ

**JE RENTRE
À LA MAISON !**

MON BÉBÉ

Nom du bébé.....

Prénom du bébé.....

Date de naissance.....

Poids de naissance.....

Date de sortie.....

Poids de sortie.....

INFOS

Quelques numéros de téléphone qui peuvent vous être utiles :

Téléphone général CHR Haute Senne : 067/348 411

Prise de rendez-vous consultations : 067/348 450

Service Pédiatrie : 067/348 680

Service des Urgences : 067/348 600

Infor allaitement : 02/242 99 33

La Leche League : 02/268 85 80

Les sages-femmes de la Maternité sont accessibles 24h/24 par téléphone au 067/348 580.

NOS RDV

Votre prochain rendez-vous chez le **pédiatre en polyclinique**

Docteur : Le à

Votre prochain rendez-vous chez le **gynécologue en polyclinique**
Présentez-vous avec votre carte d'identité aux guichets d'accueil polyclinique.

Docteur : Le à

Votre prochain rendez-vous avec **la sage-femme**

Sage-femme : Le à

Votre prochain rendez-vous **de consultation**

Docteur : Le à

Votre prochain rendez-vous **en échographie**

N'oubliez pas de prendre la demande avec vous lors de l'examen !

..... Le à

**CONSULTATIONS PÉDIATRIQUES AU CHR HAUTE SENNE
SANS RENDEZ-VOUS, DU LUNDI AU VENDREDI, DE 9H À 12H.
PRÉSENTEZ-VOUS À L'ACCUEIL.**

L'ALLAITEMENT MATERNEL

Signes de satiété

- Bébé se calme et lâche le sein spontanément
- Il s'endort au sein
- Il mouille ses couches plusieurs fois par jour
- Il fait 2 à 6 selles semi-liquides avec un allaitement maternel exclusif
- Sa peau est souple et hydratée.

Les médicaments

Demandez conseil à votre médecin, pharmacien, ou téléphonez au **Centre Anti-poison au 070/245 245.**

Position de la maman

- Position confortable
- Ambiance calme
- Attention à varier les positions

Position de bébé

- Bébé se trouve face à vous
- Sa tête n'est pas tournée, ni penchée
- Le mamelon est bien face à sa bouche

Signes d'éveil


- Bébé cherche, passe la langue
- Il suce ses doigts
- Il bouge
- Il ouvre les yeux.

La tétée

La durée des tétées varie selon les bébés et en fonction du moment de la journée. Certains bébés prendront un sein, d'autres prendront les deux. Le nombre de tétées est très variable : 6 à 12 tétées/24h.

CONSEIL

Si vous rencontrez un problème (crevasses, ...), n'hésitez pas à demander à la Maternité l'aide d'une sage-femme. Un suivi à domicile peut également être organisé.



Conserver le lait

- Récipient stérile et fermé
- Conservation **au frigo** (pas dans la porte) de 48h à 72h à +4°C
- Conservation **au freezer** : 2 semaines à -15°C
- Conservation **au congélateur** : 6 mois à -18°C
- Noter la date et l'heure sur le récipient.

Décongélation lente au frigo (12h), au chauffe-biberon ou au bain-marie (37°C). Un réchauffement trop rapide entraîne la perte des qualités nutritionnelles.

Comment arrêter ?

- Réalisez un sevrage petit à petit. Moins bébé tète, moins vous aurez de lait
- Supprimez une tétée dans la journée (pas celle du matin ou du soir) durant plusieurs jours
- Prenez le temps pour que bébé et vos seins s'y habituent
- Supprimez une autre tétée durant plusieurs jours et ainsi de suite
- Remplacez les tétées par des biberons ou des repas selon l'âge de bébé.

VEILLEZ À ADOPTER UNE ALIMENTATION SAIN ET ÉQUILIBRÉE



Le tire-lait

- Adoptez une hygiène corporelle correcte
- Lavez-vous soigneusement les mains puis séchez-les avec un essuie propre, réservé à cet usage et changé chaque jour
- Référez-vous à la notice d'utilisation.

Tire-lait manuel

- Achetez-le en pharmacie ou dans les magasins de puériculture
- Avant chaque utilisation : démontez et nettoyez chaque pièce à l'eau chaude et au savon vaisselle à l'aide d'un goupillon prévu à cet effet. Rincez le tout.
- Stérilisez-le les 4 premiers mois.

Tire-lait électrique

- Utile pour un usage plus intensif, plus rapide
- Plus onéreux
- Possibilité de location dans les pharmacies, les mutuelles ou les magasins de matériel médical.

L'ALIMENTATION AU BIBERON



90 ml = 3 mesurettes

60 ml = 2 mesurettes

30 ml = 1 mesurette

Type de lait:

.....

Votre bébé boit fois ml.
Une mesurette de lait en poudre correspond à 30 ml d'eau.

La mesurette

Utilisez uniquement la mesurette contenue dans la boîte de lait.

L'eau

L'eau plate, en bouteille, est à utiliser dans les 24h suivant l'ouverture et à conserver au frigo. Utilisez une eau minérale naturelle portant la mention « Convient pour l'alimentation des nourrissons ».

Comment procéder?

- Installez-vous sur un plan de travail propre.
- Lavez-vous correctement les mains.
- Mettez la bonne quantité d'eau dans le biberon stérilisé.
- Chauffez l'eau (bain marie, chauffe-biberon) à maximum 40°C.
- Ajoutez les mesurettes rases (passez le plat du couteau).
- Vissez la tétine en tenant la bague. Roulez le biberon entre vos mains pour mélanger.
- Vérifiez la température du lait en versant quelques gouttes sur la face interne de votre poignet. Vous ne devez sentir aucune différence de température avec votre peau.

1

Donner le biberon

- Veillez à vous poser dans un endroit calme et confortable. Le lait chauffé conserve maximum 1h.
- Jetez les restes de lait non bus. Comptez 2 heures minimum entre 2 biberons.

3

Stérilisation

- **Stérilisateur électrique** (15 minutes)
- **Micro-ondes** (voir notice du stérilisateur)
- **Casserole**: plongez le biberon dans l'eau froide avec 1 cuillère à café de vinaigre. Faites bouillir pendant 20 minutes. Ajoutez la tétine et la bague 5 minutes avant la fin. Ensuite, videz le biberon et égouttez-le sur un essuie propre prévu à cet effet.

2

Nettoyer le biberon, la tétine et la bague

- Rincez le biberon à l'eau chaude
- Lavez-le avec du liquide vaisselle et un goupillon
- Rincez-le à l'eau claire
- Laissez égoutter
- Stérilisez le tout (de préférence les 4 premiers mois)



Pour les sorties



- Transportez l'eau dans le biberon stérile. Celui-ci doit être conservé dans un frigobox.
- La poudre de lait est conservée dans un autre récipient stérile.
- Emportez un chauffe-biberon.



JE PENSE À MOI



Conseils d'hygiène vulvaire

- Évitez :
 - bain
 - piscine
 - tampons hygiéniques
- Prférez la douche au bain
- Lavez-vous les mains avant et après le change de votre bande hygiénique et le passage aux toilettes
- Réservez un essuie et un gant de toilette propre à cet effet et changez-le chaque jour.

L'accouchement par césarienne

- Le pansement est changé toutes les 48 heures par la sage-femme jusqu'à l'enlèvement des fils ou des agrafes
- Ne mouillez pas le pansement, sauf avant le soin de la sage-femme
- Évitez de porter des charges pendant 6 semaines
- Gardez les bas de contention selon la prescription du gynécologue.

En suivant ces conseils, vous réduirez ainsi les risques d'infection durant les semaines qui suivent l'accouchement, dus à l'ouverture du col.

Pensez à la rééducation post-natale

Prenez rendez-vous dans les 6 semaines après la naissance. Des kinésithérapeutes sont à votre disposition au sein de l'hôpital.

Vous recevrez une prescription lors de votre visite chez le gynécologue.



📞 067 348 700

MES RENDEZ-VOUS APRÈS L'ACCOUCHEMENT

Ne pas oublier :

- > Le rendez-vous chez la **sage-femme** à l'hôpital ou à domicile (pansement, pesée du bébé, suivi de l'allaitement, prise de sang, etc.)
- > Le rendez-vous dans les 10 jours chez le **pédiatre**. C'est à vous de prendre rendez-vous. L'ONE peut également assurer le suivi préventif des enfants.
- > Le rendez-vous à 6 semaines chez le **gynécologue**.

Les sages-femmes vous proposent de prendre vos rendez-vous au sein de l'hôpital pour votre suivi et celui de bébé. Ils seront notés dans votre livret.



LES CONSEILS POUR BÉBÉ

Hygiène de bébé

Le bain peut se faire à n'importe quel moment de la journée. Maintenez le moment choisi. Il permet d'apaiser bébé s'il est pris le soir.

Attention à chauffer la pièce à 25°C.

N'oubliez pas les petits soins lorsque bébé est habillé : yeux, nez, oreilles.

Sommeil de bébé

- Chaque bébé est différent, laissez le suivre son rythme
- Ne réveillez pas un bébé qui dort. Il existe différents types de sommeil (calme, agité, ...)
- Gardez toujours le même endroit pour dormir
- Aménagez un rituel identique chaque soir pour lui permettre de trouver ses repères et d'identifier le moment du coucher (chanson, lecture, ...)
- L'éveil d'un bébé durant la nuit est normal.

Le tabac

Ne pas fumer en présence de votre bébé. Si vous fumez, attendez 1h après votre cigarette pour allaiter. Des consultations en tabacologie sont proposées par la maternité du CHR Haute Senne.



Soins du cordon

- Laissez à l'air en dehors de la couche
- Lavez à l'eau + savon + rincer + sécher
- Il tombera entre 7 à 10 jours
- S'il suinte ou sent, demandez conseil auprès d'une sage-femme ou d'un pédiatre.

Les pleurs

Pleurer est un moyen de communication (faim, chaud, câlins, fatigue, besoin d'être changé, mal au ventre, etc.) Il est normal pour bébé de pleurer, surtout en fin de journée. Cela s'apaise lorsqu'il grandit. Si vous vous sentez dépassée et que vous êtes seule, déposez votre enfant en sécurité dans le lit ou le parc et allez prendre l'air quelques minutes. Respirez calmement et profondément plusieurs fois. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage.

Ne secouez jamais votre bébé!

RECOMMANDATIONS

La prévention de la mort subite

Dans le cadre d'un projet de prévention de la mort subite en Belgique organisé à l'initiative de la Fondation Astra, un groupe d'experts a élaboré un consensus général dont voici les grandes lignes :

- Couchez votre enfant sur le dos et évitez la position ventrale, sauf avis médical motivé.
- Veillez à ce que, durant son sommeil, votre enfant n'ait ni trop chaud ni trop froid (la température idéale de la chambre se situe entre 18°C et 20°C maximum), ne pas trop couvrir l'enfant, laisser le visage découvert et éviter l'usage d'un édredon, préférez un sac de couchage bien adapté à sa taille et à la saison.
- Faites dormir votre enfant sur un matelas ferme. N'utilisez pas d'oreiller. Écartez tout risque d'étranglement ou d'étouffement.
- Il vous est fortement déconseillé de fumer, tant durant la grossesse que durant la période qui suit l'accouchement. Ne fumez pas dans la chambre où dort votre enfant.

- Ne donnez pas de médicaments (calmants, ...) à votre nourrisson, et si vous allaitez, ne prenez aucun médicament sans l'avis du médecin.
- Veillez de manière générale à respecter le rythme de vie de l'enfant afin qu'il ne soit pas privé de ses heures de sommeil.

De manière plus particulière, veillez:

- Lorsque votre enfant s'est endormi après avoir pleuré, allez vous assurer qu'il va bien.
- La pièce où dort votre enfant doit être aérée régulièrement.
- Les animaux n'y sont pas admis quand il dort.
- En été, faites boire régulièrement votre enfant afin d'éviter qu'il ne se déshydrate.
- Présentez régulièrement votre enfant en consultation ou chez son médecin.



Enfin, soyez attentif à certains signes qui doivent vous alarmer et consultez un médecin sans tarder si votre bébé présente plusieurs des signes suivants :

- Une température rectale supérieure à 38°C ou inférieure à 36°C
- Un changement récent de son comportement: votre enfant est inhabituellement calme ou agité
- Il gémit durant le sommeil et lorsqu'il est éveillé
- Il vomit ou refuse de s'alimenter
- Il respire difficilement.

Par ailleurs, présentez votre enfant à la consultation, s'il manifeste :

- Une pâleur importante
- Une transpiration abondante pendant son sommeil et ce, sans raison
- Une respiration bruyante qui ne serait pas causée par une maladie infectieuse.

Respectez ces quelques règles et OFFREZ À VOTRE ENFANT LES MEILLEURES CONDITIONS DE SÉCURITÉ durant ses premiers mois de vie.

Pour le Groupe Belge d'Experts
Pr A Kahn, Pr H Devlieger

**CHR HAUTE
SENNE** 

Centre Hospitalier Régional
de la Haute Senne

Chaussée de Braine 49
7060 Soignies
Tél.: 067.348.411
info@chrhautesenne.be

www.chrhautesenne.be

