

A surveiller

Vous devez consulter un médecin si un ou des signes d'infection sont présents :

- Fièvre de plus de 38,5°C.
- Rougeur et chaleur qui progressent au pourtour de la plaie.
- Écoulement de pus.
- Douleur devenant plus importante.
- Gonflement qui augmente.

A noter

- La résistance de la peau sera affaiblie au site de la plaie. Il faut donc éviter toute pression sur la plaie pendant les 3 premières semaines.
- Gardez la cicatrice à l'abri des rayons du soleil pendant 3 à 6 mois et utilisez si besoin une crème solaire.
- Dès que la plaie est guérie, vous pouvez masser cette zone avec une crème hydratante.
- Une cicatrice prend un aspect définitif après un an.



Adresse et coordonnées



Service des Urgences (-1)

CHR Haute Senne - Le Tilleriau
Chaussée de Braine 49 - 7060 Soignies

Service des Urgences	067 / 348 600
Fax Service des Urgences	067 / 348 601
Prise de rendez-vous	067 / 348 450



Service des Urgences

Soins de plaies après une chirurgie mineure



Bandelettes adhésives

- Ne mouillez pas la région pendant 48 heures sauf avis contraire.
- Les bandelettes adhésives doivent rester en place à peu près pendant 10 jours.
- Si elles ont tendance à se décoller, vous pouvez couper la partie qui se décolle.
- Après 15 jours, si elles sont toujours en place, vous pouvez les enlever sans crainte.



Colle tissulaire

- Ne touchez pas l'endroit collé
- Ne mouillez pas la région pendant 24 à 48 heures. Vous pouvez vous laver, mais sans laisser l'endroit collé trop longtemps sous l'eau. Pour le séchage, tamponnez sans frotter.
- Par la suite, la colle peut être mouillée mais elle ne peut pas être frottée. Il est interdit de nager pendant la semaine qui est nécessaire à la cicatrisation.
- La colle tombe d'elle-même en 5 – 10 jours.
- N'appliquez pas de ruban adhésif. Si vous le désirez, vous pouvez mettre un pansement pour protéger l'endroit collé, en prenant soin de ne pas mettre de collant sur la colle.
- Vous ne pouvez pas mettre de pommade ni de crème sur la zone collée.



Points de suture

- Gardez le pansement en place pour 24 heures.
- Recouvrez la plaie d'un pansement sec s'il y a un risque de la salir.
- Si la plaie est plus importante, il est parfois proposé de faire le 1er pansement au dispensaire des urgences. Nous vous demandons de vous présenter impérativement dans le service des urgences entre 08h00 et 10h00.
- Désinfectez la plaie tous les jours.
- Laissez la plaie à l'air libre le plus possible sauf s'il y a un écoulement de la plaie.
- Dès qu'il n'y a plus d'écoulement de la plaie depuis 48h (ou selon l'avis du médecin), vous pouvez prendre un bain ou une douche.
- Lavez à l'eau courante (ex : douche) et séchez doucement : il est important de garder la plaie sèche pour éviter la croissance de bactéries.
- Les points de suture sont gardés en place entre 4 et 15 jours selon le site de la plaie.
- **Vos points de suture devraient être enlevés dans jours.** Ils ne sont pas enlevés dans le service des urgences. Nous vous conseillons de vous rendre chez votre médecin traitant.

